

## 11.1 REIN.

L'atteinte aiguë des reins, quelle qu'en soit la cause, peut guérir sans aucune séquelle.

### 11.1.1. NÉPHRECTOMIE.

La néphrectomie n'entraîne souvent aucune conséquence pratique au point de vue de la fonction rénale. L'incapacité sera évaluée en fonction :

- Des douleurs résiduelles ;
  - De la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité, etc.) ;
  - Et de la qualité de la compensation par le rein restant.
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative..... 15 à 20  
 - Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire..... 30 à 40

### 11.1.2. HÉMATURIE.

- Hématurie isolée ou protéinurie isolée..... 5 à 10

### 11.1.3. INSUFFISANCE RÉNALE.

- Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale..... 10 à 20
- Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle ..... 20 à 40
- Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet..... 40 à 60
- Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle..... 50 à 100

### 11.1.4. TRANSPLANTATION RÉNALE.

Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur, et de la valeur du rein..... 30 à 100

### 11.1.5. TRAUMATISME RÉNAL.

Séquelles anatomiques de traumatisme rénal..... 15 à 30

### 11.1.6. HYPERTENSION SECONDAIRE A UNE LÉSION RÉNALE TRAUMATIQUE.

(Voir appareil cardio-vasculaire).